

MELOXI CAN

MELOXICAM



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de solución oral contiene:

MELOXICAM
2 mg

EXCIPIENTES
C.S.P
1 mL



0,1 mL / 2 kg

Como continuación del tratamiento se sugiere administrar a partir del segundo día una dosis de 0,05 mL de Meloxi Can por cada 2 kg por cada 24 horas, durante 5 a 7 días.

INDICACIONES

Indicado como analgésico y antiinflamatorio en:

Perros: Analgésico y Antiinflamatorio.

Trastornos músculo esqueléticos agudos y crónicos.

Reducción del dolor pre y post operatorio tras cirugía ortopédica y de tejidos blandos.

Gatos: Como analgésico y antiinflamatorio para el manejo del dolor posoperatorio en: ovario histerectomías y cirugías de tejidos blandos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN



ORAL

Se puede suministrar directamente en la boca del animal o mezclado con el alimento.

DOSIFICACIÓN



1 mL / 10 kg

Como continuación del tratamiento se sugiere administrar a partir del segundo día una dosis de 0,5 mL de Meloxi Can por cada 10 kg cada 24 horas, durante 5 a 7 días.

PRECAUCIONES

- ✓ Debe administrarse con exactitud la dosis prescrita.
- ✓ Cuando se suministre por medio del alimento asegurarse que todo el medicamento sea consumido.
- ✓ En casos de hipersensibilidad o efectos secundarios al producto, se debe interrumpir el tratamiento.
- ✓ No suministrar concomitantemente con otros AINEs o corticoides.
- ✓ Consérvese a temperatura inferior a 30 °C y protegido de la luz.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales en gestación, lactancia o menores de 6 semanas de edad o pacientes con deshidratación, hipovolemia, irritación o úlcera gástrica, hemorragias, alteraciones hepáticas, cardíacas o renales.

**VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES VACÍOS O
CON CONTENIDO RESIDUAL DEBERÁ EFECTUARSE
SEGÚN LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES.
USO VETERINARIO.**

PRESENTACIONES

Frasco por:
15, 30 y 60 mL

