



Colombia Reg. ICA No.: 7940-MV

TRIMEFI SULFADIAZINA + TRIMETOPRIM

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de suspensión inyectable contiene:

**SULFADIAZINA
SÓDICA**
400 mg

**TRIMETOPRIM
MICRONIZADO**
80 mg

**EXCIPIENTES
C.S.P**
1 mL

TIEMPO DE RETIRO

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento.
- La leche producida durante el tratamiento y hasta 72 horas después de finalizado el mismo, no debe darse para el consumo humano.

PRECAUCIONES

- Agitar el producto antes de usar.
- No aplicar por vía endovenosa.
- Hipersensibilidad individual a los componentes del producto.
- Conservar a una temperatura inferior a 30 °C, protegido de la luz solar.

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de enfermedades de origen bacteriano en **bovinos, ovinos, porcinos y equinos**. En general para el tratamiento de procesos infecciosos ocasionados por gérmenes patógenos sensibles a la asociación tales como: *Escherichia coli*, *Haemophilus sp.*, *Fusobacterium sp.*, *Pasteurella sp.*, *Shigella sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Actinomyces sp.*, *Aerobacter sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Corynebacterium sp.*, *Campylobacter sp.*, *Klebsiella sp.*, *Bordetella sp.*

DOSIFICACIÓN

1 mL / 30 kg

diariamente por espacio de 3 a 5 días

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES VACÍOS O CON CONTENIDO RESIDUAL DEBERÁ EFECTUARSE SEGÚN LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES.
USO VETERINARIO.

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO



VÍA DE ADMINISTRACIÓN



INTRAMUSCULAR
exclusivamente

PRESENTACIONES

Frasco por:

10, 20, 50, 100 y 250 mL